

## 9. Ordlista och förkortningar

---

<b>Absolut risk</b>	Sannolikheten för en händelse i en population, uttryckt som antalet ogynnsamma utfall dividerat med totala antalet utfall
<b>Allogent ben</b>	Benvävnad från en annan individ
<b>Alveolär benhöjd</b>	Nivån på käkbenets infästning mot tandroten
<b>Amoxicillin</b>	Ett läkemedel (antibiotikum) mot infektioner
<b>Adherence</b>	Patientens följsamhet till behandlingen
<b>Angina pectoris</b>	Anfallsvis uppträdande smärta under bröstbenet som beror på akut syrebrist i hjärtmuskeln
<b>Angiografi</b>	Kontraströntgen av blodkärl
<b>Apex</b>	Rotspets
<b>Apikal</b>	Beläget vid rotspetsen
<b>Approximalt</b>	Området mellan två angränsande tänder
<b>Autogent ben</b>	Benvävnad från samma individ
<b>A<sub>2</sub></b>	Ytan under ROC-kurvan som anger metodens tillförlitlighet. Ju större A <sub>2</sub> är desto högre tillförlitlighet
<b>Baseline</b>	Vid försökets start
<b>Benmatrix</b>	Benvävnad
<b>Beslutsträd</b>	Ett sätt att åskådliggöra komplexa beslutsgångar, där ekonomiska beräkningar för varje delbeslut kan beräknas
<b>Bioaktivt glas</b>	Ett oorganiskt utfyllnadsmaterial för utfyllnad av en bendefekt
<b>Biofilm</b>	Beläggning på tandens yta
<b>Bitewingröntgenbild</b>	Röntgenfilmen (3 x 4 cm <sup>2</sup> ) placeras intraoralt och patienten biter på en ”bitvinge” av papper eller plastmaterial. I en och samma röntgenbild avbildas båda käkarnas tandkronor och benvävnad i anslutning till tandhalsen och den del av roten som är närmast kronan

<b>Blindning</b>	Förhållandet att vissa centrala omständigheter i en studie är dolda och förblir så tills undersökningen är avslutad och resultaten ska bearbetas. Vid en dubbelblind undersökning är både deltagare och all prövningspersonal ovetande om deltagarnas grupptillhörighet. Enkelblind undersökning betyder vanligen att endast deltagarna ingenting vet
<b>BoP</b>	Bleeding on probing, blödning vid sondering av gingivan, uttrycks i procent av alla sonderade ställen
<b>Bortfall</b>	Personer som gått med på att delta i en undersökning men som lämnar den innan den fullbordas
<b>Buckal</b>	Anger riktning mot kinden
<b>CCT</b>	Clinical controlled trial, kliniskt kontrollerat försök
<b>Cement-emaljgräns</b>	Gräns mellan tandkrona och tandrot
<b>Cochrane Library</b>	En samling databaser tillgänglig via Internet eller på CD-ROM. Här finns Cochranesamarbetets systematiska litteraturgenomgångar och annat vetenskapligt underlag för olika behandlingar samlade. Internetadress: <a href="http://www.update-software.com/cochrane">www.update-software.com/cochrane</a>
<b>Compliance</b>	Följsamhet till behandling, hur väl en patient följer givna föreskrifter om t ex medicinering
<b>Confounder</b>	Faktor som snedvrider resultaten i en riktning som inte har med den insatta åtgärden att göra
<b>Cytokiner</b>	Lågmolekylära proteiner bildade av ett flertal olika celler och med stimulerande eller hämmande effekt på celler av typ immunceller vad gäller tillväxt, utmognad och funktion
<b>Dentin</b>	Tandben, under tandemaljen
<b>Doxycyklin</b>	Ett läkemedel mot infektioner, bredspektrumantibiotikum
<b>EDTA</b>	Etylendiamintetraacetat, för rengöring av rotytan
<b>Efficacy</b>	Hur väl en medicinsk/odontologisk åtgärd fungerar när den undersöks i en klinisk prövning
<b>Effectiveness</b>	Hur väl en medicinsk/odontologisk åtgärd fungerar när den är i allmänt bruk i sjukvård/tandvård
<b>EKG</b>	Registrering av hjärtmuskelnns aktivitet
<b>Emaljmatrixprotein</b>	Renframställt protein från tandemalj som stimulerar till nybildning av rotcement och käkben

<b>EMD</b>	Emaljmatrixprotein som används vid behandling av marginala bedefekter
<b>Emfysem</b>	Sjuklig uppblåsning av de finaste lungblåsorna
<b>Extraoralt</b>	Utanför munhålan
<b>Fibrinogen</b>	Protein som omvandlas till fibrin vid blodets koagulering
<b>Ficksonderingsdjup</b>	Avståndet från tandköttskanten ner till tandfickans botten
<b>Ficksonderingsreduktion</b>	Minskat ficksonderingsdjup, t ex efter behandling
<b>Furkationsdefekt</b>	När nivån på käkbenets infästning mot tandroten har sänkts nedanför delningsstället mellan rötterna på flerrotiga tänder (i underkäken) respektive ovanför (i överkäken)
<b>Furkationsinvolverade</b>	Tänder med furkationsdefekt
<b>Furkatur</b>	Delningsstället mellan rötterna på flerrotiga tänder
<b>Fästevinst</b>	En förbättring av tandens infästning i käkbenet
<b>Gestationsålder</b>	Den tidsperiod en graviditet har vid givet tillfälle
<b>GI</b>	Gingivalindex, andelen ställen på tandkötet som uppvisar tecken på inflammation
<b>Gingiva</b>	Tandkött
<b>Gingivalexsudat</b>	Den utsipprade inflammatoriska vätskan i tandköttsfickan
<b>GTR</b>	Guided tissue regeneration, styrd vävnadsregeneration med hjälp av ett vävnadsvänligt membran som möjliggör återbildning av rothinna och käkben
<b>Guided tissue regeneration</b>	se GTR
<b>Hemorragisk stroke</b>	Hjärnblödning
<b>HTR polymer</b>	Utfyllnadsmaterial av plast och kalciumhydroxid
<b>Hydroxylapatit</b>	Syntetisk form av mineral som ingår i ben
<b>Icke-hemorragisk stroke</b>	Cirkulationsrubbnig i hjärnan som inte beror på en blödning

<b>In vitro</b>	Biologiska försök som utförs utanför kroppen. I studierna i föreliggande översikt har undersökning utförts på skullmaterial
<b>In vivo</b>	Biologiska försök som utförs i den levande kroppen
<b>Interleukin</b>	Tillhör cytokinerna
<b>Interventionsstudie</b>	Undersökning där deltagarna utsätts för en eller flera aktiva åtgärder, av förmodat förebyggande eller behandlande natur, vilkas effekter ska bedömas
<b>Intraoralt</b>	I munhålan
<b>Kappaindex</b>	Mått på överensstämmelsens storlek oberoende av metodens tillförlitlighet
<b>Keratiniserad gingiva</b>	Förhornat tandkött
<b>Kirurgi med benplastik</b>	Vid ett kirurgiskt ingrepp, jämna till benkanter runt tanden
<b>Kirurgi med fickeliminering</b>	Vid ett kirurgiskt ingrepp, avlägsna tandkött för att minska fickans djup
<b>Kirurgisk packning</b>	Förband
<b>Klorhexidin</b>	Ett antiseptiskt preparat
<b>Kohortundersökning</b>	En studie av en grupp personer som har vissa definierade egenskaper gemensamt. Vanligen gäller undersökningen två eller flera undergrupper i kohorten som ska jämföras med avseende på förloppet på lång sikt, t ex uppkomst av vissa angivna händelser eller förändring av mätetal
<b>Kollagenmembran</b>	Membran av isolerat och renat kollagen från djur
<b>Kontralaterala</b>	Motsatta sidan
<b>Kontrollerad undersökning</b>	Undersökning som har kontrollgrupp(er), dvs som är planlagd för att göra jämförelser. Används vanligen om interventionsstudier
<b>Korall</b>	Kalciumkarbonat från naturlig korall
<b>Korrelationskoefficient</b>	Matematiskt uttryck för styrkan i sambandet mellan två variabler
<b>Koronarförskjuten lambå</b>	Vävnadsbesparande lambåkirurgi
<b>Kortikalt ben</b>	Kompakt ben

<b>Kryobehandlat allogent ben</b>	Benvävnad som behandlats med frystorkning från annan individ
<b>Kvadranter</b>	Tanduppsättningen består av fyra kvadranter, tänderna i vänster och höger överkäke respektive vänster och höger underkäke
<b>Kyrettage</b>	Med ett vasst instrument avlägsna infekterad och inflammerad vävnad från tandköttsfickan och rotytan
<b>Lambåkirurgi</b>	Tandköttet fälls upp runt tanden så att man kommer åt att eliminera inflammatorisk vävnad och beläggningar på rotytan
<b>Likelihood-kvot</b>	Anger sannolikheten för ett positivt eller negativt utfall
<b>Lingual</b>	Anger riktning mot tungan
<b>Marginal benkant</b>	Kanten på käkbenet runt tanden som det avtecknar sig t ex på en röntgenbild
<b>Mekanisk infektionskontroll</b>	se SRP
<b>Mesial</b>	Anger riktning mot tandbågens mittlinje, riktning framåt i munnen
<b>Metaanalys</b>	Statistisk teknik som uppskattar storleken av effekten av en behandling genom att samtidigt väga in ett flertal liknande studier
<b>Mjukvävnadslambå</b>	Den vävnad som fälls upp vid lambåkirurgi
<b>Molarer</b>	De bakersta tre tänderna i varje kvadrant, inklusive visdomständer
<b>Multivariat analys</b>	Statistik som hanterar mer än en variabel samtidigt
<b>MZ</b>	Metronidazol, läkemedel (antibiotikum) mot infektion
<b>Märgben</b>	Skelettbenens inre porösa del
<b>N</b>	Newton, 1 N är definierad som den kraft som krävs för att ge 1 kg en acceleration på 1 m/s <sup>2</sup> . $N = \frac{kg \times m}{s^2}$ 1 N är den kraften som en massa på 102 gram utövar på sitt underlag i normal gravitation
<b>Observationsstudie</b>	Undersökning där uppgifter om befolkning eller personer registreras och bearbetas, i motsats till interventionsstudier där inga aktiva behandlingsförsök förekommer
<b>Ocklusal justering</b>	Slipning på tandytorna för att tänderna i överkäke och underkäke ska passa ihop bättre vid sammanbitning
<b>Ocklusalyta</b>	Tuggyta

<b>Oddsquot</b>	Kvoten mellan två odds. Oddsquoten ger en uppfattning om hur starkt sambandet är mellan exponeringen och sjukdomen. Odds är antalet fall av "händelse" dividerat med antal fall av "icke-händelse"
<b>Odds ratio</b>	Detsamma som oddsquot
<b>p</b>	Signifikansnivå
<b>PAL</b>	Probing attachment level, ficksonderingsdjup mätt från tandens cement–emaljgräns
<b>Panoramaröntgen</b>	Röntgenfilmen (15 x 30 cm <sup>2</sup> ) är placerad extraoralt. Vid exponering snurrar filmen liksom röntgenröret omkring patienten. På detta sätt får man en avbildning av båda käkarna med samtliga tänder och deras omgivande benvävnad
<b>Papillabevärande kirurgi</b>	Se koronarförskjuten lambå
<b>Parodontit</b>	Sjukdomstillstånd i tändernas stödjevävnader som karakteriseras av inflammation och de sammanlagda patologiska processer som leder till kliniskt iakttagbar vävnadsförlust
<b>Periapikal röntgenbild</b>	Röntgenfilmen (3 x 4 cm <sup>2</sup> ) placeras intraoralt i endera överkäken eller underkäken. I denna bild avbildas ett par tänder i sin helhet (krona och rot) samt omgivande benvävnad
<b>PD</b>	Pocket depth, tandköttsfickans djup mätt från tandköttskanten
<b>Piggy back-studie</b>	I efterhand lägga ekonomiska data till originalstudier om medicinska/odontologiska metoder
<b>Placebo</b>	Kontrollbehandling utan biologiskt verksamt innehåll
<b>Plack</b>	Bakteriebeläggning på tänderna
<b>Plackkontroll</b>	Förmåga att regelbundet avlägsna plack
<b>PLBW</b>	Preterm and low birth weight. För tidigt födda barn med låg födelsevikt
<b>PLI</b>	Plackindex, registrering av den genomsnittliga mängden beläggningar, plack, på tandytorna
<b>Posterior</b>	Bakre
<b>Prediktiva värden</b>	Positivt prediktivt värde: Sannolikheten för att en person/tand/yta är sjuk när utfallet av den diagnostiska metoden är positivt. Negativt prediktivt värde: Sannolikheten för att en person/tand/yta är frisk när den diagnostiska metoden är negativ

<b>Premolarer</b>	Två tänder bakom hörntänderna i varje kvadrant
<b>Prevalens</b>	Sjukdomsförekomst
<b>Progenitorceller</b>	Förstadier till celler som t ex bildar rotcement, benvävnad eller rothinna
<b>Prospektiv undersökning</b>	Studie som går framåt i tiden, dvs man börjar samla in data om varje deltagare vid den tidpunkt som han eller hon tas in i undersökningen
<b>Prostaglandiner</b>	En grupp fysiologiskt aktiva hormonliknande ämnen som finns i olika koncentrationer i människokroppens alla vävnader
<b>QALY</b>	Quality adjusted life years. Kostnaden av en insatt åtgärd per kvalitetsjusterat levnadsår
<b>QATY</b>	Quality adjusted tooth years. Kostnaden av en insatt åtgärd per kvalitetsjusterade år
<b>Randomisering</b>	Slumpvis placering av varje deltagare till en av de två eller flera grupper som definierats i en prövning (t ex grupp som får aktivt läkemedel och grupp som får placebo)
<b>RCT</b>	Randomized controlled trial, prövning som jämför två eller flera grupper och som tillämpar slumpvis fördelning av deltagarna mellan grupperna
<b>Reentry</b>	Förnyat kirurgiskt ingrepp
<b>Relativ risk</b>	Jämförelsetal som utgör kvoten mellan risktalen (antalet personer som drabbades av händelsen dividerat med totala antalet personer i gruppen) hos två undersökta grupper
<b>Reliabilitet</b>	Den säkerhet med vilken den undersökta egenskapen mäts, dvs mätnoggrannheten
<b>Retrospektiv undersökning</b>	En undersökning som är tillbakablickande, dvs utnyttjar data som förelåg redan innan undersökningen startades
<b>Risk</b>	Sannolikheten för viss händelse av negativ karaktär
<b>ROC</b>	Receiver operating characteristics. Ett sätt att beskriva en diagnostisk eller prognostisk methods tillförlitlighet där sensitivitet och specificitet vid olika tröskelvärden sätts samman i en kurva. Ytan under kurvan ( $A_2$ ) anger metodens tillförlitlighet. Ju större $A_2$ är, desto högre tillförlitlighet
<b>Root planing</b>	Avlägsna det yttre lagret av infekterat rotcement
<b>Rotcement</b>	Vävnad ytterst på roten där rothinnan fäster

<b>Rothinna</b>	System av fina trådar med vilka tanden är upphängd i käkbenet
<b>Rotytekonditionering</b>	Åvlägsna organiskt och oorganiskt material från rotytan samt åstadkomma demineralisering av rotytan i samband med rekonstruktiv kirurgi
<b>Scaling</b>	Skrapa bort beläggningar från tand- och rotytor
<b>SEM</b>	Standard error of the mean, hur nära medelvärden från upprepade undersökningar av populationer ligger det ”sanna” värdet.
<b>Sensitivitet</b>	Andelen av sjuka som metoden identifierar korrekt, dvs antalet sant positiva dividerat med antalet sjuka
<b>Signifikant</b>	En skillnad i resultat som osannolikt ska uppkomma bara av slumpen
<b>Sjukdomsrecidiv</b>	Återkommande sjukdomsepisod
<b>SN</b>	Sant negativ. Uttryck för utfallet av en diagnostisk metod. Innebär att metoden ger negativt resultat hos en person/tand/yta som är frisk
<b>Sond</b>	Millimetergraderat instrument för mätning av t ex tandköttsfickor
<b>Sonderbar fästenivå</b>	Nivån på tandens infästning i käkbenet, oftast mätt i förhållande till cement–emaljgränsen
<b>SP</b>	Sant positiv. Uttryck för utfallet av en diagnostisk metod. Innebär att metoden ger positivt resultat (påvisar sjukdom) hos en person/tand/yta som är sjuk
<b>Specificitet</b>	Andelen av friska som genom metoden identifieras korrekt
<b>Split mouth</b>	Ena halvan av munnen används som experimentdel, den andra som kontroll
<b>SRP</b>	Scaling and root planing, skrapa bort beläggningar från tand- och rotytor inklusive rotcementet
<b>Standardavvikelse</b>	Uttryck för spridningen i de data som ligger bakom t ex ett medelvärde
<b>Statistisk signifikans</b>	Mått på sannolikheten att ett resultat beror på slumpen
<b>Stroke</b>	Slaganfall
<b>Stödbehandling</b>	Efter aktiv behandling mot parodontit återkommer patienten för regelbunden professionell tandrengöring och förnyad instruktion i munhygien

<b>Supragingival scaling</b>	Borttagande av mjuka och hårda beläggningar ovanför tandköttskanten
<b>Subtraktionsradiografi</b>	Teknik för att påvisa skillnader mellan två bilder, tagna med samma projektion vid olika tillfällen
<b>Suturer</b>	Kirurgisk söm
<b>Systematiska fel</b>	En bestående och oönskad skillnad mellan i övrigt jämförbara grupper som försvårar tolkningen av studiens resultat
<b>Systematisk litteraturoversikt</b>	Sammanställning av all relevant tillgänglig vetenskaplig litteratur som berör en viss behandling, kritiskt granskade och sammanvägda
<b>Tandfästenivå</b>	Den nivå där de parodontala stödjevävnaderna fäster in mot rotytan
<b>TC</b>	Tetracyclin. Ett läkemedel mot infektioner, bredspektrumantibiotikum
<b>Transparency</b>	Genomsynlighet
<b>Triklosan</b>	Antibakteriellt ämne med brett spektrum, desinfektionsmedel inom sjukvården
<b>Tumor Necrosing Factor</b>	Tillhör cytokinerna
<b>Tvårsnittsstudie</b>	Undersökning som bygger på att varje person undersöks och/eller intervjuas vid ett enda tillfälle, varefter statistiska samband söks mellan vissa på förhand valda data
<b>Upplösning</b>	Förmåga hos optiska system att särskilja detaljer
<b>Validitet</b>	Tillförlitligheten hos ett mätprov, dvs om man verkligen mäter vad som avses att mätas. Intern validitet betecknar i vilken mån en undersökning är utförd med god vetenskaplig metodik medan extern validitet värderar ifall studiens resultat är möjliga att överföra även till andra grupper eller situationer
<b>Vävnadslambå</b>	Den vävnad som fälls upp vid lambåkirurgi
<b>Xenograft</b>	Vävnad som tas från annan art

*Källor: Medicinsk terminologi, redaktör Bengt I Lindskog, Nordiska bokhandeln förlag, 1997 samt SBU:s ordlista, [www.sbu.se](http://www.sbu.se)*